



موكب ساقي كربلاء الطبي | السنوي السابع SAQI KARBALA SEVENTH ANNUAL MEDICAL CAMP

IMAM AL-HUJJAH HOSPITAL
@ EMERGENCY DEPARTMENT

مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري
في وحدة الطوارئ

ابتداءً من 14 - 21 صفر 1445
Starting 14th - 21th of Safar



أخبارنا

مستشفانا يشهد ولادة توأم قبل موعدهما بعملية ناجحة

الفريق الطبي المؤلف من الطبيب الإختصاص الدكتور زهراء السلطاني وأطباء التخدير ومنهم الدكتور فراس والمساعدين وبقية الكادر من تقديم الخدمة الطبية الممتازة للمريضة والتي أدت إلى المحافظة على رحم المريضة وعدم القيام بعملية استئصال الرحم.



راجعت امرأة ثلاثينية في نهاية الشهر الثامن من حملها مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري وهي تعاني من آلام مخاض حادة بسبب حملها بتوأم، كما كانت تعاني من تقدم المشيمة والتصاقها، إضافة إلى عملية قيصرية سابقة. وعلى الرغم من صعوبة الحالة، تمكن

رغم صعوبة الحالة .. إعادة الحركة لسيدة ستينية مقعدة

عادت سيدة في الـ ٦٤ من عمرها إلى الحركة مجدداً بعد أن كانت مقعدة بسبب مضاعفات كسر مركب في مفصل الكاحل، وذلك بعد أن أجريت لها عملية في مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري ليعود لها الأمل مجدداً. وذكر أخصائي جراحة العظام والكسور في مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري الدكتور حيدر ظاهر: «كانت المريضة مقعدة لا تستطيع الحركة لمدة ٦ أشهر نتيجة كسر مركب في مفصل الكاحل وقد أخبروها الاطباء بأن الكسر ليس بحاجة إلى عملية، لكن وبعد تأخر الحالة بدون علاج تدهورت حتى أصبحت مقعدة وامتنع العديد من الأطباء من إجراء العملية لها بسبب تأخر الحالة». وأكد أخصائي جراحة العظام والكسور أنه «تم إجراء العملية في مستشفىنا وتم تعديل مفصل الكاحل وخرجت المريضة من المستشفى بعد يومين وخلال مدة شهرين بدأت تمشي المريضة بصورة طبيعية ولله الحمد».



بعد معاناة استمرت ٥ أعوام..

كادر نسوي متخصص ينهي مشكلة "السلس البولي" لمريضة أربعينية



أنهى فريق طبي نسوي متخصص معاناة مريضة أربعينية مع «السلس البولي» بعد محاولات كثيرة على مدار خمسة أعوام تكلمت بالنجاح أخيراً من خلال مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري. وذكرت أخصائية جراحة المسالك البولية الدكتورة زهراء ظاهر وهي الأخصائية الوحيدة في كربلاء المقدسة أن «المريضة في العقد الرابع من عمرها كانت تعاني من السلس البولي لمدة خمس سنوات وكان لها مراجعات كثيرة وعلاج ولكن بدون استجابة». وأضافت: «تمت عملية رفع جدار وعنق المثانة باستخدام شريط صناعي بتقنية (MINISLING) وهي وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعد من بين أقل المضاعفات التي تمت معالجتها بالنسبة للمريضة وأكدت ان المريضة بعد ان تمت العملية بنجاح غادرت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة.

المقال الطبي

الإصبع الزنادي

الدكتور وسام الطائي

الإصبع الزنادي حالة تجعل الإصبع عالقاً في وضع منحني، وقد يعود لوضعه الطبيعي فجأة مع حدوث طقطقة، والأصابع الأكثر إصابة هي البنصر والإبهام، ولكنها يمكن أن تصيب أي إصبع. أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذه الحالة السيدات اللاتي تتجاوز أعمارهن ٥٠ عاماً. وإذا كنت مصاباً بداء السكري أو تدهور وظائف الغدة الدرقية أو التهاب المفصل الروماتويدي، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالإصبع الزنادي. ولعل حركات الإمساك المتكررة من مثيل المهن والهوايات التي تتضمن الاستخدام المتكرر لليد والإمساك بأشياء لفترات طويلة قد تزيد من احتمال الإصابة بالإصبع الزنادية.

الأعراض

تتراوح شدة أعراض الإصبع الزنادية بين البسيطة والحادة، وتشمل ما يأتي:

- تيبس الإصبع خاصة في الصباح.
- الشعور بطقطقة أو فرقة عند تحريك الإصبع.
- الإيلام عند اللمس أو ظهور نتوء في راحة اليد عند قاعدة الإصبع المصابة.
- ثبات الإصبع في وضع منحني.

المضاعفات

يمكن لحالة الإصبع الزنادي أن تصعب الكتابة أو فغل أزرار القميص أو إدخال المفتاح في القفل، ويمكن أن تؤثر في قدرتك على الإمساك بعجلة القيادة أو التقاط الأدوات.

العلاج التحفظي

- يختلف علاج الإصبع الزنادية حسب درجة الحالة ومدة ظهوره، وقد تشمل العلاجات التحفظية:
- **الراحة:** تجنب الأنشطة التي تتطلب تكرار مسك الآلات اليدوية المتذبذبة أو التقاطها حتى تتحسن أعراضك. وإذا لم تستطع تجنب مثل هذه الأنشطة بالكلية، فقد توفر القفازات المبطنه بعض الحماية.
 - **الجبيرة:** يمكن أن يؤدي ارتداء الجبيرة إلى إراحة الوتر.
 - **تمارين الإطالة:** يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة في الحفاظ على قدرة إصبعك على الحركة.

الإجراءات الجراحية

- إذا كانت الأعراض التي تظهر عليك خطيرة أو إذا لم تساعد العلاجات التحفظية، فقد يقترح الطبيب ما يأتي:
- الحقن بالستيرويد: قد يؤدي إلى تقليل الالتهاب والسماح للوتر بالتحرك بحرية مرة أخرى.
 - **إجراء الإبرة:** بعد تخدير راحة اليد، يدخل أحد أعضاء فريق الرعاية إبرة صلبة في الأنسجة المحيطة بالوتر المصاب، ويساعد تحريك الإبرة وإصبعك على تفتيت الأنسجة التي تعيق الحركة السلسة للوتر.
 - **الجراحة:** من خلال إحداث شق صغير بالقرب من قاعدة إصبعك المصابة، يمكن للجراح شق الجزء الضيق من غمد الوتر.



ليست مجرد سيارة إسعاف.. بل وحدة طوارئ متنقلة

يوفر مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري خدمة الإسعاف الفوري على مدار ٢٤ ساعة، تحت إشراف كوادر طبية وخدمية متخصصة ومدربة بكفاءة عالية للسيطرة على حالات المرضى والمصابين الذين تتم احالتهم من وإلى مؤسسات صحية أخرى وحسب الاختصاصات المطلوبة داخل وخارج المحافظة. وتمتاز عربة الإسعاف بإحتوائها على كافة المستلزمات والأجهزة المنفذة للحياة، منها (التخطيط الكهربائي للقلب والصدمة الكهربائية وغيرها) وكذلك وجود مصدر للعلاج بالأكسجين وجهاز سحب السوائل والافرازات مع وجود سرير متحرك (سدى) لنقل المرضى والمصابين مريح جداً وسهل الحركة والتنقل، مع مجموعة من الادوية والسوائل الوريدية الخاصة لمعالجة بعض الحالات المرضية والحرجة.

خدماتنا

بإشراف أخصائي جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية
الدكتور إحسان العامري **توفر الآن**

علاج دوالي الساقين بالليزر

يمكنكم زيارة الطبيب يوم الثلاثاء مجاناً في الفترة الصباحية من كل أسبوع

للحجز الاتصال
07824852504

من هو الدكتور إحسان العامري؟

- أخصائي جراحة الصدر والقلب و الأوعية.
 - طبيب استشاري في جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية وفي علاج الدوالي بالليزر والحقن التصلبي
 - حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الطب في جامعة النهرين في عام ١٩٩٥.
 - زميل في البورد العراقي للاختصاص الطبي (جراحة الأوعية الدموية والصدر).
 - لديه خبرة في مجال الطب لأكثر من ٢٥ عاماً.
- يمكنكم زيارة الطبيب في مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري صباح كل يوم الثلاثاء من كل أسبوع.